



Bluecrop (*Vaccinium corymbosum*)

Bluecrop er – med god grund - den mest populære sort blandt amerikanske højbuskede blåbær. Har en kraftig opret vækst og bliver 1,8-2,2 m høje.

Busken giver mange runde, store bær, fra midten af august. Smagen er god, sød, mild og saftig.

Duke (*Vaccinium corymbosum*)

Duke er en tidlig sort. En forholdsvis høj, opretstående og åben busk der bliver 1,5-1,7 m høje.

Bærrene modner ca. 2 uger før Bluecrop og er store og ovale. Smagen er god og let syrlig. Smagen forbedres efter forudgående nedkøling. På køl holder bærrene sig op til 4 uger.

Reka (*Vaccinium corymbosum*)

Reka er en tidlig sort, der ligesom Duke modner ca. 2 uger før Bluecrop. Planten er mere busket end Duke og Bluecrop og bliver 1,7-2 m høj. Bærrene er meget saftige med tyndt skind, aromatisk, sød og syrlig smag.

Draper (*Vaccinium corymbosum*)

Draper er en ny, busket sort der bliver 150 cm høj.

Den er højtstående og med gode og smagsfulde bær. Bærrene er middelstore og har lang holdbarhed.

Generelt

Historie:

Blåbærssorter til dyrkning i haver, benævnes ofte 'storfrugtede amerikanske højbuskede blåbær', fordi der i staten New Jersey i 1908-10 udvalgte nogle sorter fra den vilde blåbær *Vaccinium corymbosum*, Disse blev krydset med andre arter, og de bedste blev formeret vegetativt (ved stiklinger) og tilbudt til salg. Formålet med krydsningen var få frembragt nogle store frugter, som kom op på tre til fem gram, mens de oprindelige vilde (også danske vilde blåbær) kun har en vægt på ca. et gram pr. bær. Ligeledes var målet at opnå modstandsdygtige sorter mod sygdomme, især svampesygdomme.

Plantevejledning:

Blåbær er en surbundsplante, der har det bedst med en surhedsgrad (pH-værdi) i jorden omkring 4,5. Det opnås lettest ved at plantet blåbærrene i sphagnumholdig jord. Udgrav i et spadestikdybde 1/2*1/2 m, fyld op med sphagnum og gerne så bedet hæves 10 cm over jorden. Med en greb løsnes jordbunden, som blandes med sphagnummen. Ved at hævet bedet over jorden sikres, at de øverste rødder ikke rådner (af mangel på ilt). For at beskytte mod fordampning kan overfladen af bedet dækkes med barkflis.

Pleje:

Selv kortvarig udtørring kan have negative følger, derfor er det en forudsætning for dyrkning at der kan vandes i tørre perioder.

Jævn gødningstilførsel sidst i marts, midt i maj og sidst juni med en blandingsgødning (endelige ikke kalk, da den modvirke surheden i jorden).

Gode læforhold samt en solrig plads er en forudsætning for, at planterne vil vokse tilfredsstillende og med et godt udbytte. Der bør ikke kultiveres i bedet, da de i jordoverfladen liggende rødder kan tage skade, - så renholdelse foregår ved håndlugning.